

## 平成30年 畑作・野菜 病害虫発生情報 第1号

作物名：にんにく（4月中旬）

4月16～18日に実施した巡回調査の結果をお知らせします。  
春腐病は概ね平年より少ない状況ですが、  
津軽地域の一部園地ではさび病の越冬病斑が目立っています。  
ほ場をよく見回り、初期防除を徹底しましょう。

### 1. 春腐病（発生量 少ない）

津軽地域の発生地点率は平年より低く、発病株率、発病度は平年よりやや低かった。  
県南地域の発生地点率は平年よりやや低く、発病株率、発病度は平年より低かった。  
ただし、県南地域の一部では発生程度が中発生以上のほ場が認められた。

巡回調査における春腐病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（%）				発生 地点率 （%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 （%）	発病度
4月中旬	津軽地域	本年	15	0	0	0	40.0	40.0	1.4	0.98
		前年	14	0	0	0	64.3	64.3	1.4	0.87
		平年	14	1.9	0.8	0.0	46.0	48.6	2.3	1.89
	県南地域	本年	48	0	0	2.1	29.2	31.3	0.7	0.61
		前年	47	0	0	0	42.6	42.6	1.0	0.93
		平年	39	0	0	0.8	35.6	36.4	1.1	0.82
	県計	本年	63	0	0	1.6	31.7	33.3	0.9	0.70
		前年	61	0	0	0	47.5	47.5	1.1	0.91
		平年	53	0.6	0.1	0.6	38.2	39.4	1.4	1.10

注）発生程度：甚 発病度31以上、多 同21～30、中 同11～20、少 同1～10

### 2. さび病（発生量 平年並）

津軽地域の発生地点率は平年並であったが、越冬病斑がやや目立つほ場が認められたため、  
発病株率、発病度は平年より高かった。

県南地域の発生地点率は平年よりやや低く、発病株率、発病度は平年より低かった。

巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（%）				発生 地点率 （%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 （%）	発病度
4月中旬	津軽地域	本年	15	0	0	0	20.0	20.0	3.1	1.00
		前年	14	0	0	0	0	0	0	0
		平年	14	0	0	0	23.1	23.1	1.4	0.33
	県南地域	本年	48	0	0	0	6.3	6.3	0.1	0.02
		前年	47	0	0	0	6.4	6.4	0.1	0.03
		平年	39	0	0	0	10.5	10.5	0.4	0.11
	県計	本年	63	0	0	0	9.5	9.5	0.8	0.26
		前年	61	0	0	0	4.9	4.9	0.1	0.02
		平年	53	0	0	0	14.1	14.1	0.7	0.18

注）発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同31～50、少 同1～30

#### 《この情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900  
〒030-0113 青森市第二間屋町4-11-6 担当：佐藤（正） 主査