

平成30年度 リンゴ黒星病の感染予察機(メス)による感染危険度の出現状況 県南地域(No.6最終)

青森県病害虫防除所
設置場所 南部町平

月日	感染危険度	降水量(mm)	平均気温(°C)	月日	感染危険度	降水量(mm)	平均気温(°C)	月日	感染危険度	降水量(mm)	平均気温(°C)
4月1日		4.0	5.9	5月1日	-	0.0	17.3	6月1日	S	4.0	15.9
4月2日		0.5	6.0	5月2日	-	4.0	11.1	6月2日	M	0.0	16.7
4月3日		0.0	13.1	5月3日	S	11.5	12.5	6月3日	-	0.0	20.0
4月4日		13.0	3.5	5月4日	-	1.0	10.0	6月4日	-	0.0	22.1
4月5日		0.0	3.3	5月5日	-	7.0	11.5	6月5日	-	0.0	20.7
4月6日		29.0	1.4	5月6日	-	0.0	16.5	6月6日	-	0.0	20.6
4月7日		1.5	4.8	5月7日	-	0.0	12.5	6月7日	-	0.0	21.6
4月8日		0.0	4.3	5月8日	-	0.0	8.4	6月8日	-	3.5	20.0
4月9日		3.5	4.0	5月9日	-	0.0	6.5	6月9日	S	7.5	14.0
4月10日		0.0	6.1	5月10日	-	0.0	8.3	6月10日	S	0.0	13.8
4月11日		1.0	10.5	5月11日	-	0.0	14.4	6月11日	-	5.5	15.6
4月12日		0.0	10.4	5月12日	-	0.0	17.8	6月12日	S	31.5	10.9
4月13日		0.0	7.1	5月13日	-	0.0	15.4	6月13日	S	1.0	12.3
4月14日		16.5	5.3	5月14日	-	0.0	14.6	6月14日	-	0.0	13.7
4月15日		11.5	7.7	5月15日	-	0.0	18.5	6月15日	-	0.0	11.1
4月16日		0.0	6.9	5月16日	-	0.0	21.8	6月16日	-	0.0	11.4
4月17日		0.0	8.7	5月17日	L	4.5	18.3	6月17日	-	0.0	13.7
4月18日	設置	0.0	11.1	5月18日	S	98.0	9.3	6月18日	-	0.0	16.4
4月19日	-	0.0	14.1	5月19日	S	39.0	6.6	6月19日	-	0.0	19.1
4月20日	-	0.0	13.7	5月20日	S	0.0	12.1	6月20日	-	0.0	20.2
4月21日	-	0.0	18.9	5月21日	-	0)	15.6)	6月21日	-	0.0	21.2
4月22日	-	0.0	13.6	5月22日	-	0.0	16.4	6月22日	-	0.0	20.2
4月23日	-	0.0	9.9	5月23日	-	0.0	16.8	6月23日	-	0.0	22.6
4月24日	M	12.5	8.4	5月24日	-	0.0	15.9	6月24日	-	0.0	21.9
4月25日	S	15.5	6.5	5月25日	-	0.0	15.0	6月25日	-	0.0	17.8
4月26日	S	0.5	10.8	5月26日	-	0.0	14.4	6月26日	-	0.0	16.5
4月27日	-	0.0	13.7	5月27日	-	0.0	13.3	6月27日	M	24.0	20.6
4月28日	-	0.0	10.7	5月28日	-	0.0	14.9	6月28日		3.5	23.5
4月29日	-	0.0	17.0	5月29日	-	0.0	17.1	6月29日			
4月30日	-	0.0	18.4	5月30日	-	0.0	18.8	6月30日			
				5月31日	-	13.0	17.8				

注1) 感染危険度: - (感染なし)、L(軽度)、M(中程度)、S(重度)
 なお、これらの感染危険度は実際の感染量を示している訳ではない。
 2) 降水量、平均気温は三戸のアメダス
 3) 「) 」: 準正常値