

令和2年 畑作・野菜 病害虫発生情報 第2号

作物名：にんにく（4月中旬）

4月10～15日に実施した巡回調査の結果をお知らせします。
 県南地域で春腐病の発生が多く、
 津軽地域でさび病の発生が多い状況です。
 春腐病、さび病が多く認められるほ場では、初期防除を徹底しましょう。

1. 春腐病（発生量 やや多い）

津軽地域の発生地点率は平年より高かったが、発病株率、発病度は平年よりやや低かった。
 県南地域では発生地点率、発病株率、発病度のいずれも平年より高く、中発生のほ場も認められた。

巡回調査における春腐病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（%）				発生地点率（%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率（%）	発病度
4月中旬	津軽地域	本年	17	0	0	0	82.4	82.4	1.7	1.36
		前年	17	0	0	0	47.1	47.1	1.3	1.24
		平年	14	1.9	0.8	0	44.5	47.1	2.3	1.89
	県南地域	本年	41	0	0	2.4	85.4	87.8	7.8	2.31
		前年	53	0	0	0	32.1	32.1	0.7	0.46
		平年	44	0	0	0.6	32.2	32.8	0.9	0.64
	県計	本年	58	0	0	1.7	84.5	86.2	6.0	2.03
		前年	70	0	0	0	35.7	35.7	0.9	0.65
		平年	58	0.6	0.1	0.5	35.1	36.3	1.3	0.98

注）発生程度：甚 発病度31以上、多 同21～30、中 同11～20、少 同1～10

2. さび病（発生量 やや多い）

津軽地域では、発生地点率、発病株率、発病度のいずれも平年より高く、新規病斑の形成が見られた。

県南地域では、発生地点率、発病株率、発病度のいずれも平年よりやや低かった。

なお、越冬病斑が多く認められるほ場では、4月17日付け病害虫防除指導情報第3号を参考に初期防除を徹底する。

巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（%）				発生地点率（%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率（%）	発病度
4月中旬	津軽地域	本年	17	0	0	0	64.7	64.7	3.4	0.83
		前年	17	0	0	0	70.6	70.6	4.0	1.08
		平年	14	0	0	0	24.5	24.5	1.7	0.45
	県南地域	本年	41	0	0	0	4.9	4.9	0.2	0.07
		前年	53	0	0	0	22.6	22.6	0.6	0.13
		平年	44	0	0	0	8.8	8.8	0.3	0.09
	県計	本年	58	0	0	0	22.4	22.4	1.1	0.29
		前年	70	0	0	0	34.3	34.3	1.4	0.36
		平年	58	0	0	0	12.9	12.9	0.7	0.18

注）発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同31～50、少 同1～30

《この情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900
 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 担当：技師 佐藤香緒里