

令和3年 畑作・野菜病害虫発生情報 第2号

作物名：にんにく（4月中旬）

4月14日～15日に実施した巡回調査の結果をお知らせします。
春腐病は概ね平年より少ない状況です。
さび病の発生は前年より少ないものの、生育の旺盛なほ場ではさび病が見え始めています。病斑が確認されるほ場では、初期防除を徹底しましょう。

1 春腐病（発生量：少ない）

県南地域の一部ほ場で発病株が確認されたものの、津軽地域、県南地域ともに発生地点率、発病株率、発病度はいずれも平年より低かった。

表1 巡回調査における春腐病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（%）				発生地点率（%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率（%）	発病度
4月中旬	津軽	本年	13	0	0	0	0	0	0	0
		前年	17	0	0	0	82.4	82.4	1.7	1.36
		平年	15	1.9	0.8	0	48.1	50.8	2.4	1.93
	県南	本年	50	0	0	0	12.0	12.0	0.3	0.22
		前年	41	0	0	2.4	85.4	87.8	7.8	2.31
		平年	46	0	0	0.8	36.8	37.6	1.5	0.79
	県計	本年	63	0	0	0	9.5	9.5	0.2	0.17
		前年	58	0	0	1.7	84.5	86.2	6.0	2.03
		平年	61	0.6	0.1	0.6	39.4	40.7	1.7	1.09

注) 発生程度：甚 発病度31以上、多 同21～30、中 同11～20、少 同1～10

2 さび病（発生量：やや少ない）

津軽地域における発生地点率、発病株率、発病度は、いずれも平年より低かった。
一方、県南地域の発生地点率は平年並で、発病株率、発病度は平年よりやや高かった。

表2 巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（%）				発生地点率（%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率（%）	発病度
4月中旬	津軽	本年	13	0	0	0	15.4	15.4	0.6	0.17
		前年	17	0	0	0	64.7	64.7	3.4	0.83
		平年	15	0	0	0	27.1	27.1	1.6	0.44
	県南	本年	50	0	0	0	8.0	8.0	0.6	0.14
		前年	41	0	0	0	4.9	4.9	0.2	0.07
		平年	46	0	0	0	8.0	8.0	0.3	0.09
	県計	本年	63	0	0	0	9.5	9.5	0.6	0.15
		前年	58	0	0	0	22.4	22.4	1.1	0.29
		平年	61	0	0	0	12.9	12.9	0.6	0.17

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同31～50、少 同1～30

【この情報に関する問合せ先】 青森県病害虫防除所 担当：主幹 品川 聖也
〒030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900