

アドマイヤー顆粒水和剤、クミアイアドマイヤー顆粒水和剤

1. 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）

(1) 作物削除

- ・作物名「ズッキーニ」、「うり類(漬物用)」、「豆類(種実)」を削除する。

(2) 作物削除

- ・作物名「茶」を削除する。

(3) 作物削除

- ・作物名「とうもろこし」を削除する。

(4) 施設栽培に限定

- ・作物名「ピーマン」を「ピーマン(施設栽培)」に、「きゅうり」を「きゅうり(施設栽培)」に、「にがうり」を「にがうり(施設栽培)」に、「きく」を「きく(施設栽培)」にそれぞれ変更する。

(5) 使用時期の制限

- ・作物名「かんきつ」、「りんご」、「うめ」、「すもも」、「なし」、「もも」、「ネクタリン」、「ぶどう」、「かき」、「げっきつ」の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)」を追加する。
- ・作物名「とうがらし類」、「豆類(未成熟、ただし、未成熟そらまめを除く)」、「未成熟そらまめ」の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については開花期終了後)」を追加する。
- ・作物名「すいか」、「メロン」、「かぼちゃ」の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については着果後)」を追加する。

(6) 適用病害虫の削除

- ・作物名「かんきつ」の適用病害虫から、「ケンキスイ類」及び「コアオハナムグリ」を削除する。

2. 申請者による変更理由

(1) 現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

(2) 欧州連合 (EU) においてイミダクロプリドの農薬登録が失効したことを鑑み、国内でのイミダクロプリドの使用が EU への農産物輸出の妨げとならないよう、国内での使用実態の少ない適用作物を順次削除する。

(3) ～ (6) 環境に調和した持続的な農業を目指す上で、ミツバチ・野生ハナバチ類に対する安全性を一層向上させた使用方法に変更する必要があると判断したため。

3. 適用表（今回、使用制限となる変更部分のみ）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アブラムシ類	10000～15000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
		160倍	1.6～3.2 L/10a			無人航空機による散布	
		80倍	1.6L/10a				
かんきつ	アブラムシ類 ミカンモグリカ ケンキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 コアオハナムグリ コナカイガラムシ類	5000～10000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内

	アカカカイガラムシ コナジラミ類 アザミマ類 カメムシ類						
	ミカンキジラミ	5000倍					
りんご	カメムシ類 リンゴワタムシ	5000倍		収穫3日前まで	2回 以内	2回以内	
	アブラムシ類	5000～ 15000倍					
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	5000～ 10000倍					
うめ すもも	アブラムシ類	10000倍		収穫21日前まで			
なし	コカカイガラムシ類	5000倍		収穫3日前まで			
	アブラムシ類 カメムシ類	5000～ 10000倍					
もも	アブラムシ類	5000～		収穫14日前まで			
ネクタリン	モハモグリガ カメムシ類	10000倍					
ぶどう	コカカイガラムシ類	5000倍		収穫21日前まで			
	アザミマ類 フタテンヒメコバイ	5000～ 10000倍					
かき	コカカイガラムシ類	5000倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで	3回 以内	散布	3回以内
	アザミマ類 カメムシ類	5000～ 10000倍	200～700 L/10a				
ピーマン	アブラムシ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	3回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布は2 回以内)
とうがらし 類		5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布及 び常温煙霧は合計3 回以内)
すいか	アブラムシ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで		散布	4回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内、散布は3回以内)
ズッキーニ	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミマ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで		散布	
メロン	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで		散布	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布は3 回以内)
うり類 (漬物用)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミマ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで		散布	3回以内
にがうり	アザミマ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	2回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内)
かぼちゃ	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	3回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内、散布は2回以 内)
豆類(種実)	アブラムシ類	10000倍	80～300 L/10a	収穫30日前まで	2回 以内	散布	3回以内(は種時の 土壌混和は1回以 内)

							内、散布は2回以内)
豆類 (未成熟、ただし、未成熟そらまめを除く)	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
未成熟そらまめ	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内)
茶	チャノキイロアサミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ	5000～ 10000倍	200～400 L/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
	ツマクノアオカスミカメ	5000倍					
きく	アサミウマ類	5000倍	100～300 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
げっきつ	ミカンキンラム	5000倍	200～700 L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	イダクロプロト [®] を含む農薬の 総使用回数	
かんきつ	アブラムシ類 ミカンモグリガ ゴマダラカミクリ成虫 コカイガラムシ類 アカルカイガラムシ コナジラミ類 アサミウマ類 カメムシ類	5000～ 10000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで (ただし、露地栽培については 発芽期から開花期を除く)	3回 以内	散布	3回以内	
	ミカンキンラム	5000倍						
りんご	カメムシ類 リンゴワタムシ	5000倍		収穫3日前まで (ただし、露地栽培については 発芽期から開花期を除く)	2回 以内			2回以内
	アブラムシ類	5000～ 15000倍						
	キンモンホソガ キンモンモグリガ	5000～ 10000倍						
うめ すもも	アブラムシ類	10000倍		収穫21日前まで (ただし、露地栽培については 発芽期から開花期を除く)	2回 以内			2回以内
なし	コカイガラムシ類	5000倍		収穫3日前まで (ただし、露地栽培については 発芽期から開花期を除く)				
	アブラムシ類 カメムシ類	5000～ 10000倍						
もも	アブラムシ類 モモモグリガ カメムシ類	5000～ 10000倍		収穫14日前まで (ただし、露地栽培については 発芽期から開花期を除く)				
ネクタリン								
ぶどう	コカイガラムシ類	5000倍	収穫21日前まで					

	アザミマ類 フテンヒメコバイ	5000～ 10000倍		(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)			
かき	コカカラムシ類	5000倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	3回 以内	散布	3回以内
	アザミマ類 カミシ類	5000～ 10000倍	200～700 L/10a				
ピーマン (施設栽培)	アブラムシ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	3回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布は2 回以内)
とうがらし 類		5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで (ただし、露地栽培については開花期終了後)	2回 以内	散布	
きゅうり (施設栽培)	アブラムシ類 コジラミ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布及 び常温煙霧は合計3 回以内)
すいか	アブラムシ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)		散布	4回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内、散布は3回以内)
メロン	コジラミ類 アブラムシ類 アザミマ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後)		散布	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植 時の土壌混和は合 計1回以内、散布は3 回以内)
にがうり (施設栽培)	アザミマ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	2回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内)
かぼちゃ	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後)	2回 以内	散布	3回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内、散布は2回以 内)
豆類 (未成熟、た だし、未成 熟そらまめ を除く)	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで (ただし、露地栽培については開花期終了後)	2回 以内	散布	3回以内(定植時及 びは種時の土壌混 和は合計1回以内、 散布は2回以内)
未成熟 そらまめ	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで (ただし、露地栽培については開花期終了後)	3回 以内	散布	3回以内(定植時及 びは種時の土壌混 和は合計1回以内)
きく (施設栽培)	アザミマ類	5000倍	100～300 L/10a	発生初期	5回 以内	散布	5回以内
げっきつ	ミカンキジラミ	5000倍	200～700 L/10a	発生初期 (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)	4回 以内	散布	4回以内