

アドマイヤー水和剤、クミアイアドマイヤー水和剤

1. 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）

(1) 作物削除

- ・作物名「稲」（使用方法「散布」）を削除する。

(2) 施設栽培に限定

- ・作物名「きゅうり」について、使用方法「散布」の作物名を「きゅうり(施設栽培)」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」を「ピーマン(施設栽培)」に、「にがうり」を「にがうり(施設栽培)」に、それぞれ変更する。

(3) 使用時期の制限

- ・作物名「りんご」、「なし」、「もも」、「ネクタリン」、「ぶどう」、「かき」、「うめ」、「すもも」、「くり」について、使用方法「散布」の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く)」を追加する。
- ・作物名「すいか」、「メロン」の使用時期の項に但し書きとして、「(ただし、露地栽培については着果後)」を追加する。

2. 申請者による変更理由

- (1) 現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。
- (2) ～ (3) 環境に調和した持続的な農業を目指す上で、ミツバチ・野生ハナバチ類に対する安全性を一層向上させた使用法に変更する必要があると判断したため。

3. 適用表（今回、使用制限となる変更部分のみ）

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イマダクロアクトを含む農薬の総使用回数		
稲	ツマグロヨコバイ ウカ類	2000倍	60～150 L/10a	収穫7日前まで	2回 以内	散布	3回以内 (は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)		
りんご	アブラムシ類 キンモンホリガ ギンモンハモグリガ	1000～ 2000倍	200～700 L/10a	収穫3日前まで	2回 以内	散布	2回以内		
なし	アブラムシ類 カメムシ類 チュウゴクナシキジラミ	1000倍							
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	1000～ 2000倍 1000倍							
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	1000～ 2000倍 1000倍							
ぶどう	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫14日前まで					
	フタテンヒメヨコバイ	1000倍		収穫21日前まで					
かき	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫7日前まで				3回 以内	3回以内
	カメムシ類	1000倍							

うめ すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫21日前まで	2回 以内		2回以内
くり	アブラムシ類	1000倍		収穫7日前まで	3回 以内		3回以内
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	4回以内(育苗期の株 元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布及び常温煙霧 は合計3回以内)
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	3回 以内	散布	4回以内(定植時の土 壌混和は1回以内、散 布は3回以内)
メロン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						4回以内(育苗期の株 元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布は3回以内)
にがうり	アザミウマ類			2回以内(定植時の土 壌混和は1回以内)			
ピーマン	アザミウマ類 アブラムシ類			3回以内(育苗期の株 元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布は2回以内)			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方法	イダクアプロト® を含む農薬の 総使用回数		
りんご	アブラムシ類 キンモンホガ ギンモンホケリガ	1000～ 2000倍	200～700 L/10a	収穫3日前まで (ただし、露地栽培 については発芽期 から開花期を除く)	2回 以内	散布	2回以内		
なし	アブラムシ類 カメムシ類 チュウゴクナシキンラム	1000倍							
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ	1000～ 2000倍							
	カメムシ類	1000倍							
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ	1000～ 2000倍		収穫14日前まで(た だし、露地栽培に ついては発芽期か ら開花期を除く)					
	カメムシ類	1000倍							
ぶどう	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫21日前まで(た だし、露地栽培に ついては発芽期か ら開花期を除く)					
	フタテンヒメヨコバイ	1000倍							
かき	アザミウマ類	1000～ 2000倍		収穫7日前まで(た だし、露地栽培に ついては発芽期か ら開花期を除く)				3回 以内	3回以内
	カメムシ類	1000倍							
うめ すもも	アブラムシ類	2000倍	収穫21日前まで(た だし、露地栽培に ついては発芽期か ら開花期を除く)	2回 以内	2回以内				
くり	アブラムシ類	1000倍	収穫7日前まで(た だし、露地栽培に ついては発芽期か ら開花期を除く)	3回 以内	3回以内				

きゅうり (施設栽培)	アブラムシ類 コジラミ類 アザミウマ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	4回以内(育苗期の株 元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布及び常温煙霧 は合計3回以内)
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前まで(た だし、露地栽培に ついては着果後)	3回 以内	散布	4回以内(定植時の土 壌混和は1回以内、散 布は3回以内)
メロン	アブラムシ類 アザミウマ類 コジラミ類						4回以内(育苗期の株 元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布は3回以内)
にがうり (施設栽培)	アザミウマ類			収穫前日まで	2回 以内		2回以内(定植時の土 壌混和は1回以内)
ピーマン (施設栽培)	アザミウマ類 アブラムシ類			収穫前日まで			3回以内(育苗期の株 元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布は2回以内)