

2022年りんご黒星病の予想感染危険日情報（りんご果樹課 4月18日現在）

1. 感染危険日の予想について（弘前、三戸の気象予測データによる）

予想感染危険日	4月19日	4月20日	4月21日
弘前	—	—	—
三戸	—	—	—

※りんご黒星病発生予察システムにより、感染危険日と予想された日は「○」、それ以外の日には「—」と表記します。

本システムは、主に6時間ごとの「降水」の予想から、葉の濡れが継続し、黒星病に感染しやすいと見込まれる日を「感染危険日」として、予想しているものです。

気象予測は、直前に大きく変更になるおそれがあるため、必ず、最新の天気予報を確認し、降雨前に散布しましょう。

2. 青森県の週間天気予報（4月18日 11時現在）

青森県の天気予報（7日先まで）									
2022年04月18日11時 青森地方気象台 発表									
日付	今日 18日(月)	明日 19日(火)	明後日 20日(水)	21日(木)	22日(金)	23日(土)	24日(日)	25日(月)	
津軽	晴後曇 	晴 	晴 	晴時々曇 	曇 	曇 	曇 	曇 	
降水確率(%)	-/0/20	10/0/0/0	10	20	40	40	40	40	
信頼度	-	-	-	A	B	C	C	C	
青森 気温 (℃)	最高	20	15	19 (17~21)	23 (21~25)	21 (19~24)	18 (16~22)	20 (19~25)	23 (20~28)
	最低	-	6	2 (-1~4)	5 (1~9)	9 (6~11)	10 (7~11)	8 (5~11)	10 (8~13)
日付	今日 18日(月)	明日 19日(火)	明後日 20日(水)	21日(木)	22日(金)	23日(土)	24日(日)	25日(月)	
下北・三八上北	晴後曇 	晴 	晴 	晴時々曇 	曇時々晴 	曇 	曇 	曇時々晴 	
降水確率(%)	-/0/10	10/0/0/0	10	20	30	40	40	30	
信頼度	-	-	-	A	A	B	B	C	
八戸 気温 (℃)	最高	18	13	17 (14~21)	22 (20~25)	21 (19~24)	19 (16~23)	20 (17~25)	24 (20~28)
	最低	-	6	2 (0~4)	5 (2~8)	9 (6~10)	10 (6~11)	9 (5~12)	11 (8~14)
向こう一週間（明日から7日先まで）の平年値									
降水量の7日間合計				最低気温		最高気温			
青森	平年並 7 - 20mm				5.3℃		15.0℃		
八戸	平年並 4 - 18mm				5.1℃		15.0℃		

※ 気象庁HP (https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/#area_type=offices&area_code=020000) に掲載されている青森県の週間天気予報の図を、県りんご果樹課で画像に加工。

- ・津軽地域、県南地域とも、降雨の予想はありません。

3. 防除のポイント

- ・「ふじの展葉1週間後頃」の薬剤散布は、黒石、弘前、三戸で4月20～21日頃を目安に実施してください。
- ・地域により、生育にバラツキが見られていることから、今一度、自園地の生育状況を確認し、適期に薬剤散布を実施してください。
- ・散布予定日に降雨が予想される場合は、降雨前に散布しましょう。

《 農薬使用基準の遵守 》

農薬を使用する場合は、必ず最新の農薬登録内容を確認する。

また、短期暴露評価の導入により使用方法が変更される農薬は、登録内容の変更前であっても、変更後の使用方法で使用する必要があるため、変更の有無を次のWebサイトで確認してから使用する。

- 農林水産省「農薬登録情報提供システム」

<https://pesticide.maff.go.jp/>

- （独）農林水産消費安全技術センター「農薬登録情報・速報」

http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm

- 青森県農業情報サービスネットワーク「アップルネット」農薬情報

<https://www.applenet.jp/nouyaku/>

農薬の使用にあたっては、事前に周辺住民に対し、農薬の散布日時や使用者の連絡先等を十分な時間的余裕を持って知らせる。また、農薬の飛散により、周辺作物や近隣の住宅等に被害を及ぼすことのないように農薬飛散低減対策に留意して散布する。