

平成28年 果樹病害虫発生情報 第13号

作物名：ぶどう（8月下旬）

8月下旬に実施した巡回調査（津軽地域6か所(スチューベン)、県南地域6か所(キャンベル・アーリー))の結果についてお知らせします。

1 ベと病（葉及び果房の発病）

津軽地域におけるべと病の葉及び果実への発病は確認されていない。

巡回調査におけるべと病（葉）の発生状況（品種：スチューベン）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病葉率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
津軽	本年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前々年	7	0	0	0	16.7	83.3	16.7	1.20	0.37

注）発生程度：甚 発病葉率51%以上、多 同31～50%、中 同11～30%、少 同10%以下

巡回調査におけるべと病（果房）の発生状況（品種：スチューベン）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病果房率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
津軽	本年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前々年	7	0	0	0	0	100	0	0	0

注）発生程度：甚 発病果房率51%以上、多 同21～50%、中 同11～20%、少 同10%以下

2 黒とう病（果房の発病）

津軽地域における黒とう病の果房への発病は確認されていない。

巡回調査における黒とう病の発生状況（品種：スチューベン）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病果房率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
津軽	本年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	平年	—	0	0	0	0	100	0	0	0

注）発生程度：甚 発病果房率51%以上、多 同31～50%、中 同11～30%、少 同10%以下

3 褐斑病（新梢葉の発病 県南地域：平年並）

県南地域における褐斑病の新梢葉での発病は平年並である。

巡回調査における褐斑病の発生状況（品種：キャンベル・アーリー）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病葉率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
県南	本年	6	0	0	50.0	16.7	33.3	66.7	9.33	2.83
	前年	6	0	33.3	50.0	16.7	0	100.0	26.50	8.83
	平年	—	1.4	11.0	9.5	16.2	61.9	38.1	8.72	3.14

注）発生程度：甚 発病葉率71%以上、多 同31～70%、中 同11～30%、少 同10%以下

4 晩腐病（果房の発病 県南地域：やや少ない）

県南地域における晩腐病の果房での発病は平年よりやや少ない。

巡回調査における晩腐病の発生状況（品種：キャンベル・アーリー）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病果房率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
県南	本年	6	0	0	0	33.3	66.7	33.3	0.33	0.08
	前年	6	0	0	0	83.3	16.7	83.3	1.17	0.33
	平年	—	0	0	0	40.0	60.0	40.0	0.99	0.36

注）発生程度：甚 発病果房率51%以上、多 同31～50%、中 同11～30%、少 同10%以下

《当情報に関する問い合わせ先》

青森県病虫害防除所 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6
 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900 担当：忠、柳野、藤川