

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成27年7月8日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号    | 農薬名（商品名）   | 農薬の種類名           | 製造者名       |
|---------|------------|------------------|------------|
| 第20345号 | オンダイアエース粒剤 | ダイアジノン・ベンフラカルブ粒剤 | OATアグリオ（株） |

### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

作物名「キャベツ」、「はくさい」、「ブロッコリー」、「ばれいしょ」、「ねぎ」、「すいか」、「メロン」、「なす」、「だいこん」を削除する。

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

[変更前]

| 作物名        | 適用病害虫名             | 使用量               | 使用時期                       | 本剤の使用回数 | 使用方法               | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数                                     | ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数 |    |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|---|--------------------|----|
| キャベツ       | コカアブラムシ類           | 6kg/10a<br>(2g/株) | 定植時                        | 1回      | 植穴土壌混和             | 2回以内  | 1回                 |    |
|            | コカアブラムシ類<br>ネキリムシ類 | 1g/株              | 育苗期後半<br>(但し、収穫<br>30日前まで) |         | 株元散布               |   |                    |    |
| はくさい       | コカアブラムシ類           | 6kg/10a<br>(2g/株) | 定植時                        |         | 植穴土壌混和             | 1回  |                    |    |
| ブロッコリー     | コカネキリムシ類           | 1g/株              | 育苗期後半                      |         | 株元散布               | 2回以内（粒剤の<br>生育期の処理は<br>1回以内）                          |                    |    |
| ばれいしょ      | アブラムシ類             | 6kg/10a           | 植付時                        |         | 植溝土壌混和             | 3回以内（植付前の<br>土壌混和は1回以<br>内）                           |                    |    |
| ねぎ         | ネキアサミヤネキリムシ類       |                   | 定植時                        |         |                    | 2回以内<br>(定植時の処理及び<br>生育期の株元散布は<br>合計1回以内、散布<br>は1回以内) |                    |    |
| すいか<br>メロン | アブラムシ類             | 3kg/10a           | 定植時                        |         | 作条土壌混和             | 4回以内（粒剤の<br>生育期の処理は<br>3回以内）                          |                    | 1回 |
| なす         |                    |                   |                            |         |                    | 3回以内（粒剤の<br>生育期の処理は<br>2回以内）                          |                    |    |
| だいこん       | ネジノミハムシ<br>ネキリムシ類  | 3～6kg/10a         | は種時                        | 播溝土壌混和  | 2回以内（生育期は<br>1回以内） |   |                    |    |

[変更後]

削除

**【 変更理由 】**

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は1日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。